

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS

AMETREX 50 SC

HERBICIDA-TRIAZINA

AMETRINA



DAÑO

ANTIDOTO:NO TIENE

DENSIDAD: 1.08 g/ml a 25°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR
EXPOSICION

"NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION"

"MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS"



USO AGRONOMICO

MODO DE ACCION: Es un herbicida de acción pre y postemergente que inhibe la fotosíntesis e interrumpe otros procesos enzimáticos. Es absorbido por las raíces y el follaje.

EQUIPO DE APLICACION: Durante el uso y manejo de **AMETREX 50 SC** use el equipo de protección consistente en lentes, mascarillas, guantes, botas de hule y overol de mangas largas. No coma, beba o fume durante el manejo y aplicación de este producto. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento. Antes de usar **AMETREX 50 SC**, calibre con agua el equipo de aspersión, para verificar que está aplicando la dosis correcta. **AMETREX 50 SC**, puede ser aplicado con boquillas de abanico y un volumen de agua de 300 a 400 litros por hectárea (200 a 500 litros por manzana). El equipo de aplicación puede ser bomba de espalda tipo manual o de motor y equipo adaptado al toma de fuerza del tractor y equipos de aplicación aérea.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA: Al preparar la mezcla, llene el tanque a la mitad con agua y vierta la dosis completa de **AMETREX 50 SC** que va a utilizar y mézclelo; posteriormente complete el agua a utilizar. Si utiliza mezclas de **AMETREX 50 SC** con otros pesticidas, haga premezclas por separado y luego vierta al tanque la mezcla. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo con el tanque de la aspersora, debe utilizar un tazón o copa de medida de 25 cc. Después de la aplicación lave el equipo de protección y el equipo de aplicación; báñese bien con agua y jabón y pongase ropa limpia. La ropa utilizada no deberá usarla sin ser previamente lavada.



RECOMENDACIONES DE USO: **AMETREX 50 SC**, debe aplicarse en suelos con buena humedad y malezas en proceso de germinación o sobre suelos desnudos o limpios de malezas. No permita la deriva de la aspersión hacia cultivos vecinos. No asperjar cuando hay mucho viento. No aplique cuando el suelo tenga residuos vegetales o demasiada materia orgánica en proceso de descomposición y evite que entre en contacto con el cultivo. No asperjar cuando hay mucho viento. Los siguientes cultivos listados son los aprobados para uso de **AMETREX 50 SC** en Guatemala.

CULTIVO: Maíz (*Zea mays*), Caña de azúcar (*Saccharum spp.*) y Piña (*Ananas comosus*).

MALEZAS QUE CONTROLA:

MALEZAS DE HOJA ANCHA: Bledo (*Amaranthus spp.*), Altamisa (*Ambrosia spp.*), Cadillo (*Bidens spp.*), Apazote (*Chenopodium album*), Bejuco (*Convolvulus spp.*), Crotalaria (*Crotalaria spp.*), Diente de león (*Emilia sonchifolia*), Valeriana (*Erechtites spp.*), Golondrina (*Euphorbia spp.*), Verdolaga (*Portulaca oleracea*), Botoncillo (*Richardia brasiliensis*) y Yerba de sapo (*Sonchus oleraceus*).

MALEZAS GRAMINEAS: Zacate Parí (*Brachiaria spp.*), Arrocillo (*Echinochloa spp.*), Guarda rocío (*Digitaria spp.*), Pata de gallina (*Eleusine indica*), Zacate de Guinea (*Panicum spp.*), Zacate amargo (*Paspalum spp.*) y Cola de zorro (*Setaria spp.*).

DOSIS: La dosis recomendada de **AMETREX 50 SC** es:

CULTIVO	DOSIS	RESTRICCION
Maíz	1.2 a 3.60 l/ha (0.84 a 2.52 l/mz)	Aplicar cuando el cultivo tenga más de 25 cm de altura. Evite aplicar sobre el cultivo, puede ocurrir fitotoxicidad.
Caña de azúcar:	7.2 a 14.4 l/ha (5 a 10 l/mz) 4.0 a 8.0 l/ha (2.8 a 5.6 l/mz)	Dependiendo de las condiciones del campo, puede aplicarse a la siembra o preemergencia del cultivo. Aplicar la dosis más alta en suelos pesados. Postemergencia del cultivo y malezas.
Piña:	14.4 l/ha (10.0 l/mz)	Aplicar antes de la emergencia de malezas, antes de la siembra o antes del corte. No aplicar más de 52.8 l/ha/año.

INTERVALO DE APLICACION: Dependerá de la dosis utilizada, pero generalmente se aplica una sola vez por año.

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y LA COSECHA: En piña aplicar 15 días antes de cosechar. En maíz y caña de azúcar no hay restricción.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: Las áreas tratadas con **AMETREX 50 SC** pueden ser inspeccionadas 24 horas después de efectuada la aplicación. Si va en mezcla con otro agroquímico consultar en el panfleto la restricción del mismo.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: Compatible con otros herbicidas de uso agrícola. Efectuar una premezcla por separado para verificar la compatibilidad si va a utilizar otro herbicida.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene este producto en un lugar fresco y ventilado, bien sellado en su envase original y etiquetado, alejado de fuentes de calor ya que es inflamable, bajo llave y alejado de casas de habitación y de los niños. No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico y pecuario en general.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE
HABITACION
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y
APLICACION DE ESTE PRODUCTO
BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA



SINTOMAS DE INTOXICACION: Depresión, letargo, respiración rápida y laboriosa, náuseas, vómitos, diarrea, acidez, gastroenteritis, irritación de la piel y membranas mucosas, ojos y garganta.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTION: Induzca el vómito dando a beber jarabe de ipecacuana, repitiendo hasta que el vómito fluya claro. Dar atención médico.

POR INHALACION: Lleve al paciente a un lugar ventilado.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese durante 15 minutos con agua limpia.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Qúitese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A
PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO: No tiene antídoto específico. Provoque el vómito, continuar con lavado gástrico, posteriormente suministre una solución acuosa de carbón activado. Dar tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION

Guatemala Centro de Información y Asistencia Toxicológica 2513560 y 2320735

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE: Tóxico para peces, no contamine lagunas, ríos, canales de riego, lagos, drenajes y otras fuentes de agua.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos del producto deben enjuagarse tres veces, agregar el agua del enjuague a la mezcla: no permita que los envases sean utilizados para otros fines o propósitos. Destruya el envase y entierrelo por lo menos a 40 cm de profundidad, alejado de fuentes de agua y casas de habitación. En caso de derrames utilice un material absorbente como aserrín, recoja con una pala y entierrelo a 40 cm de profundidad alejado de fuentes de agua, casas de habitación y áreas de pastoreo.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA
DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN
PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: El fabricante y formulador garantiza que el contenido de este envase corresponde a la composición especificada en la etiqueta. No se responsabiliza por el uso que de él se haga, lo cual estará a riesgo exclusivo del comprador.

FABRICANTE Y FORMULADOR: AGAN CHEMICAL MANUFACTURES LIMITED. Northern Industrial Zone, P.O. Box 262, Ashdod, Israel.

IMPORTADO POR:

PAIS
GUATEMALA

NUMERO DE
REGISTRO
243-10

FECHA DE
REGISTRO
22-07-96