

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

ADAMA
ESSENTIALS



Tomahawk 20 EC

HERBICIDA – ÁCIDO PIRIDIN CARBOXÍLICO
FLUROXIPIR

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

SOLVENTE: NAFTA

DENSIDAD: 0,98 g/ml a 20° C.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN: El Fluroxipir es un herbicida regulador de crecimiento tipo auxínico, capaz de ser absorbido por las plantas a través de las hojas y de superficie recién cortadas, actúa en gran parte por contacto con las hojas, se trasloca tanto en el floema como en el xilema, regula la síntesis de proteínas y enzimas en las células a través de su efecto sobre la síntesis y el metabolismo de los ácidos nucleicos.



EQUIPO DE APLICACIÓN: Tomahawk 20 EC puede aplicarse con aspersora de espalda o equipo terrestre. No utilice el mismo equipo de aplicación en otros cultivos sensibles. Utilice boquilla de abanico plano tipo 8002 ó 8003. El producto no causa daños físico-químicos al equipo de aplicación ni utensilios usados.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Para su preparación llene el tanque de aspersión a la mitad de su capacidad, con el agitador en movimiento agregue la cantidad requerida de producto y llénelo hasta el total de su capacidad. Aplique un volumen total de 400-600 litros de agua por hectárea y una presión constante del equipo de aplicación. Use la mezcla el mismo día de preparada. Limpie bien su equipo de aplicación antes de usar este producto y al terminar de usarlo lávelo con suficiente agua. Deseche el agua de lavar los equipos en un lugar lejos de fuentes de agua. El personal que efectúe la mezcla y el lavado de los equipos debe usar guantes, botas de hule, mascarilla y anteojos.

RECOMENDACIONES DE USO: USOS AUTORIZADOS EN: GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA, COSTA RICA, REPUBLICA DOMINICANA, PANAMÁ

CULTIVO

Pastos

Se aplica en dosis de 0.5-2.0 l/hectárea, (0.35-1.4 l/mz) en postemergencia de la maleza (3-4 hojas verdaderas).

MALEZAS A CONTROLAR:

Escobilla Sida spp, Ciperáceas Cyperus spp, Batatilla Ipomoea spp, Dormilona Mimosa pudica,
Aromo Acacia spp, Meloncillo Cucumis spp, Chiquizacillo Richardia scabra, Frijolillo Cleome aculata

ÉPOCA DE APLICACIÓN: se aplica la follaje de la malezas y cuando estas tengan 5 hojas verdaderas y estén en activo crecimiento, o sea en post-emergencia.

INTERVALO DE APLICACIÓN: una sola aplicación al inicio del cultivo.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: No procede.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas. O utilizar el equipo de protección personal.

FITOTOXICIDAD: Tomahawk 20 EC no es fitotóxico a las dosis recomendadas, en caso de mezcla, realice una prueba a pequeña escala para verificar compatibilidad y fitotoxicidad.

COMPATIBILIDAD: No se conoce incompatibilidad con los herbicidas de uso común en los cultivos recomendados en este panfleto.

